

Flector® EP Gél 60, 100 g

Diklofenak Epolamín



rýchla úľava od bolesti



silný analgetický účinok
v mieste bolesti



vhodný na rehabilitácie



bez solárnych a kontaktných
alergií¹⁻⁴



STOP bolesti, zápalu a reumatickým ťažkostiam

Skrátená informácia

Flector® EP Gél 60 a 100 g

Zloženie lieku: 100 g dermálneho gélu obsahuje: Diclofenac epolamine 1,292 g. **Terapeutické indikácie:** Pre lokálnu liečbu zápalu spôsobeného traumou šliach, väziv, svalov a kĺbov po vyvrtnutí, dislokácii, pomliaždení a presilení svalov. **Kontraindikácie:** Známa je individuálna precitlivosť na diklofenak, kyselinu acetylsalicylovú a iné nesteroidové protizápalové lieky (NSAID-y), ako aj na izopropanol a propylénglykol. **Upozornenia:** Flector® EP Gél sa nesmie aplikovať na otvorené rany (škrabance, rezné rany, atď.). Vyhnúť sa styku s očami a sliznicou. **Literatúra:** 1 Vadala A., D'Agostini S., Ghia M.: Human repeat insult patch test with DHEP-Plasters, double blind study. 1991. 2 Cantor S. et al.: Photoallergy maximization test on 25 human subjects. 1999. 3 Cantor S. et al.: 21 Day relative cumulative irritancy study. 2000. 4 Cantor S. et al.: Evaluation of phototoxicity potential by UV-A irradiation on 20 human subjects. 2000.

Liek obsahuje diklofenak epolamín. Pozorne čítajte písomnú informáciu pre používateľov lieku a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.



Flector® EP Náplast'

Diklofenak Epolamín



Bolesti kĺbov a chrbtice

Športové poranenia

Zápalové a degeneratívne ochorenia

Úrazy z preťaženia

Reumatizmus



Doprajte si viac pohybu

Skrátená informácia

Flector EP Tissugel 2 a 5 ks

Zloženie lieku: Každá náplast' 10 cm x 14 cm obsahuje 14 g gélu. **100 g gélu obsahuje:** Diclofenac epolamine 1,292 g. **Terapeutické indikácie:** Pre lokálnu liečbu zápalu spôsobeného traumou šliach, väzív, svalov a kĺbov po vyvrtnutí, dislokácii, pomliaždení a presilení svalov. Na lokálne ošetrenie reumatických bolestí, lokálna symptomatická liečba bolesti pri epikondylitíde a vyvrtnutom členku. **Kontraindikácie:** Známa je individuálna precitlivosť na diklofenak, kyselinu acetylsalicylovú a iné nesteroidové protizápalové lieky. **Upozornenia:** Flector® EP sa nesmie aplikovať na otvorené rany (škrabance, rezné rany, atď.) a od 6. mesiaca tehotenstva. Vyhnúť sa styku s očami a sliznicou.

Balenie: 2, 5 a 10 ks

Liek obsahuje diklofenak epolamín. Pozorne čítajte písomnú informáciu pre používateľov lieku a poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Výrobca: **IBSA Institut Biochimique SA**, Lugano, Švajčiarsko
Zastúpenie pre SR: **IBSA Slovakia s.r.o.**, Šancová 72, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/5262 0978, Fax: 02/5262 0979, E-mail: ibsa@ibsa.sk
www.ibsa.sk

