

Trápia vás často vaginálne mykózy?

Vaginálnu mykózu prekonajú aspoň raz za život tri štvrtiny všetkých žien. Poznáte to – svrbenie, pálenie, pošvový výtok, často i bolesť pri pohlavnom styku, či pri močení...

Čo mykózu vyvoláva?

Tento zápal pošvy spôsobujú kvasinky rodu Candida. Jeho vznik môže uľahčiť užívanie antibiotík, ochorenie cukrovkou, tehotenstvo, hormonálna substitučná liečba, nadmerná konzumácia sladkého jedla, stres. Príčinou môže byť i nesprávna hygiena – predovšetkým nadmerné umývanie intímnych partií a používanie parfémovaných mydiel a vložiek, ťažkosti často vznikajú po kúpaní v bazéne s chlórovanou vodou, niekedy i po pohlavnom styku.

K premnoženiu kvasiniek prispieva teplé a vlhké prostredie, najmä nosenie mokrých plaviek či tesných, nevzdušných nohavíc, v ktorých sa intímne oblasti ľahko zaparia. Niekedy však dôjde k mykóze i bez zjavnej príčiny.

VEĽKÝM PROBLÉMOM JE, KEĎ SA MYKÓZA VRACIA A OPAKUJE

Na liečbu akútnych vaginálnych mykóz sú bežne používané lieky a prostriedky – tzv. antimykotiká. Mnohým ženám sa však mykózy, vrátane veľmi nepríjemných ťažkostí i po tejto liečbe neustále vracajú. V takomto prípade je potrebné organizmu pomôcť, aby sa ochorenie, pokiaľ je to možné, neopakovalo.

Vhodné riešenie – podporná liečba Wobenzymom

Najnovšie to potvrdzujú výsledky projektu „Overenie účinnosti Wobenzymu v komplexnej liečbe opakovaných vaginálnych mykóz“, ktorého sa zúčastnilo 7 ambulantných gynekologických pracovísk v Českej republike. Počas dvoch rokov bolo sledovaných 62 žien (od 18 do 48 rokov). Výsledky boli vyhodnotené dátovým centrom Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny IKEM v Prahe.

Čo trápilo pacientky najviac:


- svrbenie (95% všetkých žien)
- výtok (93%)
- pálenie (66%)
- bolesť pri pohlavnom styku (53%)
- bolesť pri močení (40%)

Ako boli liečené?

Počas celej doby sledovania (celkom 2 roky) bola na liečbu akútnych mykóz používaná štandardná antimykotická liečba vo forme čípkov, masť alebo tabliet. Bol porovnaný počet vaginálnych mykóz u každej pacientky za 12 mesiacov bez podpornej liečby Wobenzymom s nasledujúcim obdobím 12 mesiacov od začiatku podávania Wobenzymu. Ženy užívali Wobenzym v dávke 2x8 dražé denne po dobu 10 týždňov.

Na začiatku mykózy štyri a viackrát za rok

V roku pred zahájením liečby Wobenzymom, kedy pacientky dostávali len štandardnú antimykotickú liečbu, mal najväčší počet sledovaných pacientiek – 48 žien – mykózu 4 krát. Šesť žien ju prekonalo 5 krát, päť žien 6 krát. Po jednej pacientke zo sledovaného súboru 62 žien malo mykózu 7 krát, 8 krát a 9 krát.



Zlepšenie u všetkých

V sledovanom období 12 mesiacov od zahájenia liečby Wobenzymom zostalo 39 pacientiek (63% zo všetkých) úplne bez mykóz. 17 pacientiek (27,4%) malo mykózu len raz, zvyšných 6 pacientiek (9,6%) viac ako raz.

U všetkých sledovaných pacientiek došlo v roku od zahájenia podpornej liečby Wobenzymom k zlepšeniu – t.j. zníženiu počtu opakovaných mykóz.

Pre aké balenie Wobenzymu sa rozhodnúť?

Pokiaľ sa rozhodnete pre podpornú liečbu opakovaných vaginálnych mykóz, je potrebné využívať do konca minimálne jednu celú dózu Wobenzymu 800 dražé v dávke 2x8 dražé denne. Pre zachovanie dlhodobého efektu odporúčame dodržať kúru po dobu 10 týždňov tak, ako to bolo v projekte (celkom 1.120 dražé).

Je teda len na vás:

vyplatí sa vám investovať do toho, aby ste sa dlhodobo zbavili opakovaných vaginálnych mykóz, alebo prinajmenšom výrazne obmedzili ich počet?

Podrobnosti o projekte a viac informácií o liečbe Wobenzymom na www.wobenzym.sk
Konzultácie: telefónom na 0911 723 175

písomne na: MUDr. Richard Zachar, Kútovská 9, 971 01 Prievidza
e-mailom na: natures@mail.t-com.sk

KDE EŠTE WOBENZYM MÔŽE POMÔČŤ PRI GYNEKOLOGICKÝCH PROBLÉMOCH?

• Gynekologické zápal, chlamýdiové infekcie

Chlamýdiové infekcie a bakteriálne gynekologické zápal sa zásadne liečia antibiotikami. Enzým obsiahnuté vo Wobenzyme, pri súčasnom podávaní s antibiotikami, zlepšujú ich prienik do zápalom postihnutých tkanív, a tým zvyšujú účinnosť liečby. Wobenzym tiež zlepšuje imunitu narušenú ochorením, a tiež výrazne znižuje riziko opakovania gynekologických zápalov a chlamýdiových infekcií a ich prechodu do chronického stavu.

Dávkovanie: 3x5 (alebo 2x8) dražé Wobenzymu denne po dobu 2 týždňov. V počiatočnej fáze užívať spolu s antibiotikami a pokračovať i po skončení antibiotickej liečby.

• Gynekologické operácie, pôrod

Wobenzym obmedzuje vznik opuchov a urýchľuje ich vstrebávanie, podieľa sa na zmiernení bolesti a významne skracuje dobu hojenia. Znižuje riziko zápalových pooperačných komplikácií, prípadne, pokiaľ k nim už došlo, uľahčuje ich liečbu.

Dávkovanie: 3x5 až 3x10 dražé denne. Úvodnú vyššiu dávku užívať až do 10 dní po výkone, potom postupne znižovať na 3x3 dražé denne. Užívať do úplného odoznenia príznakov.

• Fibrocystická mastopatia

Pri tomto chronickom ochorení prsníka s tvorbou cýst a väziva, ktoré trápi mnoho žien, Wobenzym zmierňuje bolestivosť a prináša výraznú úľavu.

Dávkovanie: 2x10 dražé denne, užívať najmenej po dobu 6 týždňov. Liečbu zahájiť až po vyšetrení lekárom!

• Lymfatické opuchy (lymfedémy)

Wobenzym zlepšuje priechodnosť lymfatických ciev, urýchľuje vstrebávanie lymfatického opuchu. Najviac sa osvedčila komplexná liečba Wobenzymom v kombinácii s rôznymi fyzioterapeutickými postupmi (bandážovanie, manuálna alebo prístrojová lymfodrenáž, špeciálne cvičenia). Účinok Wobenzymu je najväčší, pokiaľ je liečba zahájená už v latentnom (skrytom) štádiu lymfedému, kedy je ochorenie len na začiatku.

Dávkovanie: Zahájenie liečby 2x10 alebo 3x7 dražé denne, neskôr znižovať až na 3x3 dražé. Úvodnú dávku užívať minimálne 4–5 týždňov, ďalej podľa výsledkov liečby a doporučenie lekára.

Spôsob užívania

Wobenzym užívať nalačno, nikdy s jedlom, najmenej 2 hodiny po poslednom predchádzajúcom jedle a aspoň 12 hodiny pred ďalším jedlom. Nerozhryzené tablety výdatne zapíť najmenej 200 ml tekutiny (voda, čaj, minerálka). Nesprávne užívanie lieku znižuje jeho vstrebávanie a tým i účinok.

viac na www.wobenzym.sk

konzultácie na tel.: 0911 723 175

Tradičný liek z prírodných zdrojov k vnútornému užitiu. Starostlivo čítajte príbalovú informáciu. Pri tehotenstve a v priebehu dojčenia vždy konzultujte užívanie Wobenzymu s lekárom.

Wobenzym®

Pomáha pri liečbe gynekologických zápalov

Inzercia

„Už ma netrápia opakované vaginálne mykózy“

Po pridaní Wobenzymu

k štandardnej liečbe:

- menej vaginálnych mykóz u všetkých pacientok
- takmer dve tretiny z nich bez mykóz celý rok

Z výsledkov projektu overenia účinnosti Wobenzymu u opakovaných vaginálnych mykóz, uskutočneného v ČR. Wobenzym nenahrádza liečbu antimykotickými prípravkami, ako podporný liek však pomáha obmedziť opakovanie ochorenia.